

COVID-19

Quoi faire si mon enfant de 6 mois à 5 ans présente des symptômes?

Mon enfant présente au moins UN des symptômes suivant :

Fièvre

- Température rectale de 38,5°C (101,3 °F) et plus

Symptôme respiratoire

- Toux (nouvelle ou aggravée)
- Essoufflement
- Difficulté à respirer
- Mal de gorge

Symptôme généraux

- Perte d'odorat soudaine (sans congestion nasale) avec ou sans perte de goût
- Mal de tête
- Fatigue intense
- Douleurs musculaires généralisées (non liées à un effort physique)
- Perte d'appétit importante

Symptômes digestifs

- Nausées ou vomissements
- Douleur au ventre
- Diarrhée

Vaccins et symptômes de la COVID

L'apparition de symptômes compatibles à la COVID pourrait survenir à la suite de l'administration de vaccin. Dans cette situation, référez-vous à ce [site](#) pour connaître les recommandations.

Le ou les symptômes se sont **résolus**

L'enfant peut retourner dans son milieu

Après 24h d'isolement de l'enfant à la maison

Mon enfant **n'est pas un contact étroit** d'un cas de COVID

Au courant OU au terme du premier 24 heure d'isolement de l'enfant à la maison

Mon enfant développe UN des critères de dépistage de la COVID suivant :

- Fièvre $\geq 38,5^{\circ}\text{C}$ (Rectale)
- Symptôme respiratoire :
toux (nouvelle ou aggravée)
OU
essoufflement
OU
difficulté à respirer
- Mal de gorge ET fièvre modérée $\geq 38,1^{\circ}\text{C}$ (Rectale)
- Douleurs au ventre, vomissements OU diarrhée ET fièvre modérée $\geq 38,1^{\circ}\text{C}$ (Rectale)

Mon enfant **est un contact étroit** d'un cas de COVID

J'avise le service de garde ou l'école et **mon enfant ainsi que les personnes qui habitent avec lui s'isolent à la maison.**

Mon enfant doit passer un test de dépistage rapide si disponible

En cas d'impossibilité d'accès à ces tests, mon enfant est considéré comme une personne atteinte de la COVID-19.

Si le résultat est **positif**

Mon enfant doit s'isoler et suivre ces [consignes](#).
Les personnes qui vivent sous le même toit que lui doivent suivre ces [consignes](#).

Si le résultat est **positif**

Si le résultat est **négatif**,
Mon enfant ainsi que les personnes qui habitent avec lui doivent s'isoler et je dois observer ses symptômes pendant **24 heures**

Après 24 heures, mon enfant doit passer un 2^e test de dépistage rapide

Si le résultat est **négatif** et que **les symptômes de mon enfant perdurent ou s'aggravent**: maintenir un isolement et consulter un professionnel de la santé au besoin.

Si le résultat est **négatif** et que **les symptômes de mon enfant diminuent et qu'il ne fait pas de fièvre**, tous peuvent réintégrer leurs milieux selon les critères usuels de retour en service de garde et en continuant de respecter les consignes sanitaires.